


A photograph of a vineyard in Patagonia. In the background, a worker wearing a white cap and dark clothing is tending to a vine. The vineyard rows stretch into the distance under a clear blue sky with some light clouds. The foreground shows the tops of grapevines with green and yellowing leaves.

RÍO NEGRO

PATAGONIA





**SUPERFICIE
CULTIVADA**


1,455.5
Hectáreas



0.75%
del país




38.4%
de la región



Tintas **66.75%**
Blancas **28.46%**
Rosadas **4.79%**

- Serie de valles ubicados en la cuenca de los ríos Colorado y Negro, que atraviesan la provincia de oeste a este.
- Los veranos son largos y permiten que las vides crezcan de manera constante. Las enfermedades criptogámicas tienen poco efecto en esta área. Además, los riesgos de heladas y granizo son bajos.
- El valle inferior del Río Negro recibe la influencia del Océano Atlántico.



12/16°C
54/61°F
TEMP.

Media anual



190 mm/año
7.9 in/año
LLUVIAS

Media anual

WINKLER ZONE




VARIETADES

Distribución por color
(elaboración)*

SUPERFICIE
CULTIVADA*

1,455.5
Hectáreas

0.75%
del país



Tintas **66.75%**
Blancas **28.46%**
Rosadas **4.79%**



PRINCIPALES VARIETADES

- Malbec
- Merlot
- Torrontés
- Pinot Noir
- Cabernet Sauvignon
- Pedro Giménez

RÍO NEGRO	Ha.	% País	% Región	% Provincia	% Color
VARIETADES TINTAS	971,6	0,50%	26,81%	66,75%	100,00%
Malbec	377,7	0,19%	10,42%	25,95%	38,87%
Merlot	220,3	0,11%	6,08%	15,14%	22,67%
Pinot Noir	126,1	0,06%	3,48%	8,66%	12,98%
Cabernet Sauvignon	94,0	0,05%	2,59%	6,46%	9,67%
Syrah	49,8	0,03%	1,37%	3,42%	5,13%
Cabernet Franc	26,7	0,01%	0,74%	1,83%	2,75%
Bonarda	12,4	0,01%	0,34%	0,85%	1,28%
Petit Verdot	12,3	0,01%	0,34%	0,85%	1,27%
Tempranillo	10,3	0,01%	0,28%	0,71%	1,06%
Tannat	0,2	0,00%	0,01%	0,01%	0,02%
Otras variedades tintas	41,8	0,02%	1,15%	2,87%	4,30%
VARIETADES BLANCAS	414,2	0,21%	11,43%	28,46%	100,00%
Torrontés Mendocino	69,8	0,04%	1,93%	4,80%	16,85%
Torrontés Riojano	63,8	0,03%	1,76%	4,38%	15,40%
Torrontés Sanjuanino	58,6	0,03%	1,62%	4,03%	14,15%
Pedro Giménez	59,6	0,03%	1,64%	4,09%	14,39%
Sauvignon Blanc	46,0	0,02%	1,27%	3,16%	11,11%
Chardonnay	39,1	0,02%	1,08%	2,69%	9,44%
Semillón	31,3	0,02%	0,86%	2,15%	7,56%
Moscatel de Alejandría	5,9	0,00%	0,16%	0,41%	1,42%
Chenin	4,5	0,00%	0,12%	0,31%	1,09%
Riesling	4,2	0,00%	0,12%	0,29%	1,01%
Viognier	1,1	0,00%	0,03%	0,08%	0,27%
Otras variedades blancas	30,3	0,02%	0,84%	2,08%	7,32%
VARIETADES ROSADAS	69,7	0,04%	1,92%	4,79%	100,00%
Cereza	11,3	0,01%	0,31%	0,78%	16,21%
Criolla Grande	3,7	0,00%	0,10%	0,25%	5,31%
Criolla Chica	0,3	0,00%	0,01%	0,02%	0,43%
Otras variedades rosadas	54,4	0,03%	1,50%	3,74%	78,05%

PATAGONIA RÍO NEGRO

Indicaciones Geográficas (IGs)


RÍO NEGRO

- Alto Valle de Río Negro
- Avellaneda
- General Conesa
- General Roca
- Pichimahuida
- Río Negro



Alto Valle de Río Negro IG

- Oasis de 160 km de largo por 10 km de ancho al pie de la meseta patagónica. Se desarrolla principalmente en la margen norte del curso superior del Río Negro.




 38°30' / 39°05' S
 66° 45' / 68° 30' O
LOCALIZACIÓN
 ÁREA CULTIVADA


ÁREA CULTIVADA
2,849.6
 Hectáreas
 Departamentos
 General Roca, El Cuy,
 Confluencia and Añelo

 **PRINCIPALES VARIEDADES**

- Malbec
- Cabernet Sauvignon
- Merlot
- Pinot Noir
- Torrontés

- Marcada **amplitud térmica**, característica del carácter continental.
- Viento:** factor climático importante, principalmente de octubre a diciembre. Su intensidad obliga a la instalación de cortinas protectoras (“almedas” / álamos). En el mismo período hay alta frecuencia de días con vientos fuertes (superiores a 43 km/h). Su dirección predominante es del Oeste y Suroeste, fría y seca. Período con mayor frecuencia de condiciones de calma: abril a julio.
- Este factor aporta beneficios al cultivo, ya que reduce en gran medida el peligro de enfermedades en la vid.

265
870

180
590



ALTITUD DE VIÑEDOS

msnm/psnm



15.5 °C
59.9 °F
TEMP.


Media anual



197.7 mm/año
7.78 in/año

LLUCIAS

Media anual




SUELO

De origen fluvial, heterogéneos. Subsuelo pedregoso, del tipo grava, con granulometrías que pueden ir desde los 3 a 10 cm de diámetro, suelos mixtos: franco arcillosos, franco arenosos y con porcentajes mixtos de grava en superficie, que pueden ir desde el 5% al 30%. Suelos pobres en materia orgánica.

Valle Inferior do Río Negro

- Se ubica al este de la provincia de Río Negro (Departamento Adolfo Alsina). Se extiende a lo largo de 100 km (oeste a este)) siguiendo la margen sur del Río Negro. La zona recibe la influencia del Océano Atlántico.
- Está delimitado por dos mesetas, Cuchillas Norte y Sur (25 a 35 m de altura). Es una llanura de suave pendiente hacia el mar y una altitud media de 4 msnm, con algunas



**SUPERFICIE
CULTIVADA**

98.1
Hectáreas

Departamento Adolfo Alsina



6.7%
provincia

Departamento Adolfo Alsina



**PRINCIPALES
VARIEDADES**

- Malbec
- Cabernet Sauvignon
- Merlot
- Sauvignon Blanc
- Pinot Noir



**40° 41' S
63° 64' O**

**LOCALIZACIÓN
ÁREA CULTIVADA**

16

53

4

13

**ALTITUD DE
VIÑEDOS**

msnm/psnm



**14.1 °C
57.4 °F**

TEMP.

Media anual



**408 mm/año
16.6 in/año**

LLUVIAS

Media anual

- Mes más lluvioso: marzo (52,8 mm) y el más seco es agosto (23,1 mm). Las precipitaciones son más abundantes en primavera-verano (64,9% de las precipitaciones), de gran importancia para fines agrícolas. Esto se debe a las exigencias de las plantaciones en pleno crecimiento, así como a la incidencia de altas temperaturas y vientos predominantes de sectores secos.



WINESOFARGENTINA.COM

  @winesofarg

 /winesofargentina